



سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی

دفتر حیات وحش و آبنیان آبهای داخلی

جیبیر

## Gazella bennettii



تهیه کننده : ممد رضا مسینی

hoseynimr@yahoo.com

دی ماه ۱۳۹۵

### مشخصات ظاهری

از رده پستانداران ، راسته زوج سمان ، خانواده گاوسانان بوده و شباهت زیادی به آهو دارد با این تفاوت که در جیبیر ماده ها شاخهای نازک ، بلند و مستقیمی دارند ولی آهوهای ماده فاقد شاخ اند . شاخ جیبیرهای نر قوس زیادی به خارج ندارد و قدری موازی به نظر می رسند و خمیدگی انتهای شاخ نیز به طرف جلو متمایل است .



### زیستگاه

مناطق بیابانی و استپی ، معمولاً تپه ماهورهای کوتاه و بوته زارهای بلند را به دشت های صاف ترجیح میدهند.

### رفتارشناسی

روزگرد است . گاهی شبها نیز به چرا می پردازند . غالباً به صورت جفت یا دسته های کوچک ( ۵ تا ۱۵ رأس) دیده می شوند . جیبیر در مقابل کم آبی بسیار مقاوم است و می تواند آب مورد نیاز خود را از برگ گیاهان تامین کند . حیوان پرتاقتی است و شرایط

سخت مناطق کویری را بخوبی تحمل می کند و برعکس آهو به محیط های زراعی و محیط های انسانی گرایش نداشته و اغلب در نواحی شور کویری به چشم می خورد .



### تولید مثل

در مناطق گرمسیر اوایل پاییز و در مناطق سردسیر اواخر پاییز جفت گیری می کند . مدت آبستنی حدود ۱۷۰ روز است و یک یا دو بچه می زاید . ماده ها قادرند چند روز پس از زایمان جفت گیری کنند بنابراین جیبیرها میتوانند دوبار در سال تولیدمثل کنند . در ۲۰ ماهگی بالغ می شوند و طول عمر حدود ۱۲ سال است .

### وضعیت حفاظتی

تعریفی برای این گونه در فهرست سرخ IUCN نشده است ولی در ایران جزء گونه های حمایت شده میباشد. دشمن طبیعی جیبیر یوز ، کاراکال و گرگ است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۶ آمار آن حدود ۲۳۷۰ راس میباشد.



