



سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی

دفتر حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی

قوچ کرمان

O. o.laristanica X O. o.cycloceros



تهیه کننده : ممد رضا مسینی

با همکاری بخش پستانداران

دی ماه ۱۳۹۵

بدنیا می آورند . در ۱/۵ سالگی بالغ می شوند طول عمر گاهی به ۱۴ سال می رسد.

وضعیت حفاظتی

همه گونه های قوچ و میش در ایران در وضعیت آسیب پذیر (VU) می باشند و ضوچ و میش در ضمیمهٔ CITES II قرار دارد .

تهدیدات و خطرات

دشمن طبیعی قوچ و میش گرگ ، پلنگ ، یوزپلنگ و سگهای اهلی هستند و در سالهای اخیر به علت تخریب زیستگاه و ناامنی در آن ، اشغال زیستگاهها و آبخورها توسط دامهای اهلی و شکار بی رویه جمعیت آنها به شدت کاهش یافته است . به طور کلی به جز در مناطق شرق و غرب ایران که به ترتیب قوچ های اورپال و ارمنی خالص زندگی می کنند در بسیاری از مناطق دیگر کشور بر اثر اختلاط و تاثیرات شرایط زیستی قوچ و میشها از نظر فرم شاخ ، جثه ، رنگ و حتی تعداد کروموزومها با یکدیگر متفاوتند

عکس : فریبرز شکرایی

این قوچ ها از هیبرید قوچ های لارستان با قوچ های افغانی بوجود آمده اند . فرم و پیچش شاخها شبیه قوچ اورپال است و میش ها نیز اغلب دارای شاخ های کوتاهی هستند . تعداد کروموزومها ۵۴ تا ۵۵ میباشد.

پراکنندگی

از نواحی جنوب کرمان (سیرجان ، خیر ، بافت حیرفت) ایرانشهر (بزمان) تا مرز پاکستان

زیستگاه

تپه ماهورها و دامنه کوهستانها

رفتار شناسی قوچ ها

قوچ و میش ها روزگرد هستند . گاهی شب ها نیز به چرا می پردازند ، به صورت اجتماعی زندگی می کنند .

تولیدمثل

در مناطق گرمسیر از اوایل مهرماه و در مناطق سردسیر از اواسط آذرماه شروع به جفت گیری می کنند و در این فصل بین نرها جدال هایی در می گیرد و نرهای غالب ، با چند ماده جفتگیری می کنند . دورهٔ آبستنی حدود ۱۶۵ روز است و معمولاً ۱ تا ۲ بره

